

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAGMURLA DAMLAMLA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAG	*Filizler uyanma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	*Doğum öncesi *Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*15- 20 cm boya *40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	*Toprak hazırlığına toprağa sıkılır. *Tavalara su doldurulurken uygulanır.	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇAY	*Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	*2-3 yaprak ve *8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	*Filizlenme öncesi *Bahar döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	*Kardeşlenme döneminde *Beyrak yaprak dönemi	200-250 ml/100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*15-20 günde bir uygulama	150-200 ml/100 L su	1-2 L / da



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%35
Organik Karbon	% 15
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
pH Aralığı	(4,6 - 6,6)



SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 1 L

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	*Filtizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	*Filtizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAĞ	*Filtizler uyanma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Filtizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	*Filtizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	*Doğum öncesi *Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KİVİ, İNCİR	*Filtizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*15- 20 cm boyda *40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	*Toprak hazırlığına toprağa sikilir *Tavalarla su doldurulurken uygulanır.	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇAY	*Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	*2-3 yaprak ve *8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	*Filtizlenme öncesi *Bahar döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	*Kardeşlenme döneminde *Bayrak yaprak dönemi	200-250 ml/100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*15-20 günde bir uygulama	150-200 ml/100 L su	1-2 L / da



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%35
Organik Karbon	% 15
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 5
pH Aralığı	(4,6 - 6,6)

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.


NET: 1 L

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	YAĞMURLA DAMLAMLA
NARENCİYE	*Çiçeklenme öncesi * Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
BAG	*Filizler uyanma dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MUZ	*Doğum öncesi *Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
Kivi, İNCİR	*Filizlenme dönemi *Meyve büyüme dönemi	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	*Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFİSTİĞİ	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	*15- 20 cm boya *40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	*Toprak hazırlıgında toprağa sikilir. *Tavolara su doldurulurken uygulanır.	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ÇAY	*Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	*2-3 yaprak ve *8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	*Filizlenme öncesi *Bahar döneminde	200-250 ml/100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	*Kardeşlenme döneminde *Bayrak yaprak dönemi	200-250 ml/100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	*15-20 günde bir uygulama	150-200 ml/100 L su	1-2 L / da



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%35
Organik Karbon	% 15
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 5
pH Aralığı	(4,6 - 6,6)

da	Organik Karbon	% 15
da	Toplam Azot (N)	%3
da	Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 5
da	pH Aralığı	(4,6 - 6,6)

A large, stylized illustration of a biological structure, possibly a cell or tissue, rendered in shades of blue and white. The structure is curved and occupies the lower half of the page, with a white border separating it from the table above.

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 1 L