

**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

# Ferro Class

**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ** (w/w)  
Suda Çözünür Demir (Fe) %6  
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) %6

**EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı** (3-9)  
Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI**



**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

# Ferro Class

**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ** (w/w)  
Suda Çözünür Demir (Fe) %6  
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) %6

**EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı** (3-9)  
Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI**



**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

# Ferro Class

**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ** (w/w)  
Suda Çözünür Demir (Fe) %6  
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) %6

**EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı** (3-9)  
Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI**



**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

## Ferro Class

### UYGULAMA DOZAJLARI

| BİTKİ                                                | UYGULAMA ZAMANI                                             | YAPRAKTAN gr/dekar (100 lt su ile) | DAMLA SULAMADAN gr/dekar (1 ton su ile) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| DOMATES, BİBER, HİYAR, PATLICAN                      | Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar | 75-100                             | 200-250                                 |
| KAVUN, KARPUZ, KABAK                                 |                                                             |                                    |                                         |
| ÇİLEK                                                |                                                             |                                    |                                         |
| BAĞ, KIVI                                            | Sürgün oluşumu başlangıcında                                | 75-100                             | 200-250                                 |
| MUZ                                                  | Gelişme dönemi boyunca                                      | 200-250                            | 300-350                                 |
| NARENCİYE                                            | İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında               | 100-150                            | 200-250                                 |
| KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK                  |                                                             |                                    |                                         |
| ELMA, ARMUT, AYVA                                    | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| ZEYTİN                                               |                                                             |                                    |                                         |
| MISIR, AYÇİÇEĞİ                                      | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren,            | 75-100                             | 200-250                                 |
| PATATES, ŞEKER PANCARI                               | Yumurı illeşme döneminde                                    | 75-100                             | 200-250                                 |
| BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK                                 | Kardeşlenme döneminde                                       | 75-100                             | -                                       |
| PAMUK                                                | Taraklanma başlangıcında, kaza oluştuktan önce              | 75-100                             | 200-250                                 |
| FASULYE, NOHUT, MERCİMEK                             | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI                         | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) | 5. yaprak açmadan önce                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ                               | Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren            | 75-100                             | 200-250                                 |
| YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK                      | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |

#### UYARILAR

- \* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- \* Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- \* Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \* Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

#### DEPOLAMA

- \* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- \* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

#### ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen kontrasyonlarda çözünür,hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

#### KARIŞILIRLIK

Yüksek alkali ilaçlar, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırli preparatlar ile karışmaz.

#### FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

#### TAAHHÜT

**Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.**

TESCİL NO : 28080  
LİSANS NO : 199  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 1 kg

**İTHALATÇI FİRMA**  
**merkez**  
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA  
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA  
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48  
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

## Ferro Class

### UYGULAMA DOZAJLARI

| BİTKİ                                                | UYGULAMA ZAMANI                                             | YAPRAKTAN gr/dekar (100 lt su ile) | DAMLA SULAMADAN gr/dekar (1 ton su ile) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| DOMATES, BİBER, HİYAR, PATLICAN                      | Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar | 75-100                             | 200-250                                 |
| KAVUN, KARPUZ, KABAK                                 |                                                             |                                    |                                         |
| ÇİLEK                                                |                                                             |                                    |                                         |
| BAĞ, KIVI                                            | Sürgün oluşumu başlangıcında                                | 75-100                             | 200-250                                 |
| MUZ                                                  | Gelişme dönemi boyunca                                      | 200-250                            | 300-350                                 |
| NARENCİYE                                            | İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında               | 100-150                            | 200-250                                 |
| KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK                  |                                                             |                                    |                                         |
| ELMA, ARMUT, AYVA                                    | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| ZEYTİN                                               |                                                             |                                    |                                         |
| MISIR, AYÇİÇEĞİ                                      | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren,            | 75-100                             | 200-250                                 |
| PATATES, ŞEKER PANCARI                               | Yumurı illeşme döneminde                                    | 75-100                             | 200-250                                 |
| BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK                                 | Kardeşlenme döneminde                                       | 75-100                             | -                                       |
| PAMUK                                                | Taraklanma başlangıcında, kaza oluştuktan önce              | 75-100                             | 200-250                                 |
| FASULYE, NOHUT, MERCİMEK                             | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI                         | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) | 5. yaprak açmadan önce                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ                               | Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren            | 75-100                             | 200-250                                 |
| YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK                      | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |

#### UYARILAR

- \* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- \* Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- \* Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \* Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

#### DEPOLAMA

- \* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- \* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

#### ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen kontrasyonlarda çözünür,hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

#### KARIŞILIRLIK

Yüksek alkali ilaçlar, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırli preparatlar ile karışmaz.

#### FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

#### TAAHHÜT

**Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.**

TESCİL NO : 28080  
LİSANS NO : 199  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 1 kg

**İTHALATÇI FİRMA**  
**merkez**  
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA  
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA  
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48  
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

**Ec Fertilizer**  
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

## Ferro Class

### UYGULAMA DOZAJLARI

| BİTKİ                                                | UYGULAMA ZAMANI                                             | YAPRAKTAN gr/dekar (100 lt su ile) | DAMLA SULAMADAN gr/dekar (1 ton su ile) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| DOMATES, BİBER, HİYAR, PATLICAN                      | Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar | 75-100                             | 200-250                                 |
| KAVUN, KARPUZ, KABAK                                 |                                                             |                                    |                                         |
| ÇİLEK                                                |                                                             |                                    |                                         |
| BAĞ, KIVI                                            | Sürgün oluşumu başlangıcında                                | 75-100                             | 200-250                                 |
| MUZ                                                  | Gelişme dönemi boyunca                                      | 200-250                            | 300-350                                 |
| NARENCİYE                                            | İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında               | 100-150                            | 200-250                                 |
| KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK                  |                                                             |                                    |                                         |
| ELMA, ARMUT, AYVA                                    | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| ZEYTİN                                               |                                                             |                                    |                                         |
| MISIR, AYÇİÇEĞİ                                      | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren,            | 75-100                             | 200-250                                 |
| PATATES, ŞEKER PANCARI                               | Yumurı illeşme döneminde                                    | 75-100                             | 200-250                                 |
| BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK                                 | Kardeşlenme döneminde                                       | 75-100                             | -                                       |
| PAMUK                                                | Taraklanma başlangıcında, kaza oluştuktan önce              | 75-100                             | 200-250                                 |
| FASULYE, NOHUT, MERCİMEK                             | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI                         | Sürgün faaliyeti başladıktan sonra                          | 75-100                             | 200-250                                 |
| YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) | 5. yaprak açmadan önce                                      | 75-100                             | 200-250                                 |
| SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ                               | Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren            | 75-100                             | 200-250                                 |
| YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK                      | Gelişme dönemi boyunca                                      | 75-100                             | 200-250                                 |

#### UYARILAR

- \* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- \* Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- \* Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \* Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

#### DEPOLAMA

- \* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- \* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

#### ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen kontrasyonlarda çözünür,hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

#### KARIŞILIRLIK

Yüksek alkali ilaçlar, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırli preparatlar ile karışmaz.

#### FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

#### TAAHHÜT

**Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.**

TESCİL NO : 28080  
LİSANS NO : 199  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 1 kg

**İTHALATÇI FİRMA**  
**merkez**  
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA  
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA  
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48  
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr