EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI
Sebzelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
Taş Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.
Bağlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.
Çileklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.
Patateslerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.
Muz: Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0,06

nektar

SPRAYGRO LIQUID FERTILIZERS

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
Tel: 00 618 8447 7266

ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4071
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI
Sebzelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
Taş Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.
Bağlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.
Çileklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.
Patateslerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.
Muz: Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0,06

nektar

SPRAYGRO LIQUID FERTILIZERS

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
Tel: 00 618 8447 7266

ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4071
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI
Sebzelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
Taş Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.
Bağlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.
Çileklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.
Patateslerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.
Muz: Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0,06

nektar

SPRAYGRO LIQUID FERTILIZERS

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
Tel: 00 618 8447 7266

ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4071
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !