EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

# FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,06 |

**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

**Sebzelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.

**Taş Çekirdekli Meyvelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

**Bağlarda:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.

**Çileklerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Patateslerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.

**Muz:** Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar ( toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs. ) kullanıcının sorumluluğundadır.

**TAAHHÜT:** Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:**

Orjinal ambalajında normal şartlar altında ( serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

**UYARILAR:**

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**LİSANS NO** : 116
**TESCİL NO** : 2022TK4071
**PARTİ NO** :
**ÜRETİM TARİHİ** :
**SON KULL. TARİHİ** : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

**NET: 5 L**

**İTHALATÇI FİRMA**
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

**ÜRETİCİ FİRMA**
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
**Tel: 00 618 8447 7266**

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,06 |

**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

**Sebzelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.

**Taş Çekirdekli Meyvelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

**Bağlarda:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.

**Çileklerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Patateslerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.

**Muz:** Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar ( toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs. ) kullanıcının sorumluluğundadır.

**TAAHHÜT:** Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:**

Orjinal ambalajında normal şartlar altında ( serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

**UYARILAR:**

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**LİSANS NO** : 116
**TESCİL NO** : 2022TK4071
**PARTİ NO** :
**ÜRETİM TARİHİ** :
**SON KULL. TARİHİ** : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

**NET: 5 L**

**İTHALATÇI FİRMA**
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

**ÜRETİCİ FİRMA**
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
**Tel: 00 618 8447 7266**

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,06 |

**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

**Sebzelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıştır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.

**Taş Çekirdekli Meyvelerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

**Bağlarda:** Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.

**Çileklerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Patateslerde:** Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlayın.

**Muz:** Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar ( toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs. ) kullanıcının sorumluluğundadır.

**TAAHHÜT:** Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

Suda, tavisye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:**

Orjinal ambalajında normal şartlar altında ( serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı **+5 ila +40 ⁰C** derece arasında olmalıdır.

**UYARILAR:**

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**LİSANS NO** : 116
**TESCİL NO** : 2022TK4071
**PARTİ NO** :
**ÜRETİM TARİHİ** :
**SON KULL. TARİHİ** : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

**NET: 5 L**

**İTHALATÇI FİRMA**
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

**ÜRETİCİ FİRMA**
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Fax: 00 618 8240 1844
**Tel: 00 618 8447 7266**

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !