

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FOCUS 10-50+5+TE

Garanti Edilen İçerik:

%W/W

Toplam Azot (N)	10
Amonyum Azotu (N)	10
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	50
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	50
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

CLONE KİMYA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AOSB 3. KISIM MAH. 25 CAD. 15 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
TEL: 02425022707 FAX: 2425022717

UYARILAR

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 1303

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık :0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-12,5-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 - 30-35-40 -45-50 kg

CLONE KİMYA TARIM
SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
AOSB. 3. Kısım Mah. 25. Cadde No:15
Döşemealtı/ANTALYA
Kurumlar V.D. 1750459873 Tic.Sic.No:35680
Mersis No:0176018942909018
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
ELMA, ARMUT VB.	Meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
BAĞ	Tatlı su yürüdüktan sonra 2 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	İç dolum dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
ZEYTİN	Meyve büyüme dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
MUZ	Doğumdan sonra 5 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi 5 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi 5 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
KAVUN, KAPUZ	Meyve büyüme dönemi 5 uygulama	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Hasattan 15 gün önce	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
MERCİMEK	Tane dolum dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İç dolum dönemi	200-250 g / 100 L	3 – 4 kg
ÇELTİK .	Tane dolum dönemi	200-250 g / 100 L	2 – 3 kg
ÇAY	Biçimden 20 gün önce	200-250 g / 100 L	2 – 3 kg
ŞEKER PANCARI,	Yumru büyüme dönemi	200-250 g / 100 L	2 – 3 kg
MEYVE FİDANLARI	Sökümden 1 ay önce	200-250 g / 100 L	2 – 3 kg
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Tane dolum dönemi	200-250 g / 100 L	-
Yeşil Alan bitkileri	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	200-250 g / 100 L	-

Tahıl ve yeşil alanlarda topraktan kullanıma elverişli değildir.

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

CLONE KİMYA TARIM
SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
AOSB. 3. Kışım Mah. 25. Cadde No:15
Döşemealtı/ANTALYA
Kurumlar Y.D. 1760458172 Tic.Sic.No:35643
Mersis No:0176018942909018
Haydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi