

EC FERTILIZER  
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

## FOCUS 15-30-15+ME

**Garanti Edilen İçerik:**

**% W/W**

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Toplam Azot (N)                                                                          | 15   |
| Amonyum Azotu (N)                                                                        | 5,8  |
| Nitrat Azotu (N)                                                                         | 4,5  |
| Üre Azotu (N)                                                                            | 4,7  |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 30   |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                          | 30   |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                                           | 15   |
| Suda Çözünür Bor (B)                                                                     | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)                                                                  | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe)                                                                  | 0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)                                                                 | 0,04 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                                  | 0,05 |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



**ÜRETİCİ FİRMA**

CLONE KİMYA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
AOSB 3. KISIM MAH. 25 CAD. 15 DÖŞEMEALTI / ANTALYA  
TEL: 02425022707 FAX: 2425022717

**UYARILAR**

\*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.\*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.  
\* Temas halinde bol su ile yıkayınız. \*Önerilen dozajı aşmayınız \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. \*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz  
\*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA:**

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 1303

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık :0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5-10- 15-20 -25- 30-40 -50 kg

CLONE KİMYA TARIM  
SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.  
AOSB. 3. Kısım Mah. 25. Cadde No:15  
Döşemealtı/ANTALYA  
Kurumlar V.D. 1760498270 Tic.Sic.No:35660  
Mersis No:0176018942900018  
Haydar Ali KARAKOÇ  
Firma Temsilcisi

## UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                            | UYGULAMA DÖNEMİ                                 | UYGULAMA DOZU       |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                 |                                                 | YAPRAKTAN           | TOPRAKTAN |
| NARENCİYE                                       | Çiçeklenme öncesi 2 uygulama                    | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| ELMA, ARMUT VB.                                 | Çiçeklenme öncesi 2 uygulama                    | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ,<br>VIŞNE, ERİK ve NAR   | Çiçeklenme öncesi 2 uygulama                    | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| BAĞ                                             | Filizler 15-20 cm olduğunda                     | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                           | Çiçeklenme öncesi                               | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| ZEYTİN                                          | Çiçeklenme öncesi                               | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| MUZ                                             | Doğumdan 45 gün önce 3 uygulama                 | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| KİVİ, İNCİR                                     | Çiçeklenme öncesi 2 uygulama                    | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| DOMATES, BİBER                                  | Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| HIYAR, PATLICAN                                 | Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| KAVUN, KAPUZ                                    | Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile 5 uygulama | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                                | Dikimden hasata kadar 3 uygulama                | 200 – 250 g / 100 L | 2 – 4 kg  |
| MERCİMEK                                        | Çiçeklenme öncesi                               | 200 – 250 g / da    | 2 – 4 kg  |
| YERFISTIĞI                                      | Çiçeklenme öncesi                               | 200 – 250 g / da    | 2 – 3 kg  |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ,<br>MISIR, KANOLA vb.           | Bitkiler 30-40 cm iken                          | 200 – 250 g / da    | 3 – 4 kg  |
| ÇELTİK .                                        | Kardeşlenme dönemi                              | 200 – 250 g / da    | -         |
| ÇAY                                             | Biçimden 20 gün önce                            | 200 – 250 g / da    | -         |
| ŞEKER PANCARI                                   | Yumru oluşum dönemi                             | 200 – 250 g / da    | 2 – 4 kg  |
| MEYVE FİDANLARI                                 | Filizlenme dönemi                               | 200 – 250 g / da    | 2 – 4 kg  |
| HUBUBAT (Buğday,<br>Arpa, Çavdar, Yulaf<br>vb.) | Kardeşlenme dönemi                              | 200 – 250 g / da    | -         |
| Yeşil Alan bitkileri                            | Biçimden sonra                                  | 200 – 250 g / da    | -         |

\*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m<sup>2</sup> için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

CLONE KİMYA TARIM  
SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.  
AOSB. 3. Kısım Mah. 25. Cadde No:15  
Döğemeçli/ANTALYA  
Kurumlar V.D. 1760458123 Tic.Sic.No:35643  
Mersis No:0176018942909018  
Haydar Ali KARAKOÇ  
Firma Temsilcisi