

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Axor Amino

<u>Garanti Edilen İçerik</u>	<u>% (W/W)</u>
Organik Madde	25
Organik Karbon	10
Organik Azot	2
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
Serbest Aminoasitler	6
pH : 4,5-6,5	



Uyarılar:

- *Dikkat! Çocuklardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- * Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Tavsiyeler:

- * Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
- * Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

Depolama Şartları:

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, -5 °C/+40 °C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

Firma Beyanı:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.



UYGULAMA DÖNEMLERİ VE DOZAJLARI

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA Da/100L su/mL	TOPRAKTAN (DAMLAMA/ YAĞMURLAMA) DEKARA/L
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Çilek, Kavun, Karpuz, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç v.b), Soğan, Sarımsak, Lahana, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler, Ispanak, Marul, Maydanoz v.b.	-Fidenin şaşırtılması ve/veya vejetatif gelişim başlangıcından hasada kadar tekrarlarla uygulanır.	200-250	2-4 L
Turunçgiller, Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Ceviz, Badem, Antepfıstığı, Vişne, Kayısı, Erik, Nektarin, Nar, Zeytin v.b Yaprağını döken ağaçlarda	-Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Vejetatif uyanmadan itibaren uygulamaya başlanır ve uygulamalar hasada kadar devam eder.	200-250	2-4L
Bağ	-Budamadan hemen sonra -Gözler uyanırken -Çiçekten önce -Koruk döneminde -Hasattan sonra	200-250	2-4 L
Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Şeker Pancarı, Patates, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Pamuk, Nohut, Soya, Yerfıstığı v.b.	-Topraktan ve yaprakтан vejetatif gelişmenin başlangıcından itibaren 2-4 tekrarlarla uygulanır.	200-250	1-4 L
Kesme Çiçek	-Gülde, uyanma dönemi başında -Tomurcuk fışkırması -Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	150 -200	2-4 L
Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.b.), Yeşil Alan	-Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde yetiştirme sezonu boyunca 1-3 tekrarlarla uygulanır.	50-300 mL/dekar	

Tescil No: 11417 Lisans No: 1603 Üretim Tarihi: Kapakta yazmaktadır.

Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Parti no: Kapakta yazmaktadır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri;

Net Hacim: 0,25 – 0,5 – 1 – 2-3-4- 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 -40 L

ÜRETİCİ: : AGROAXOR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YÜKSEKALAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÇİL İŞHANI 41 12 MURATPAŞA ANTALYA

TEL& FAX: 02423111205

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 7223 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ

