

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
BREVA PREMIUM 18-18-18 + TE

Garanti Edilen İçerik:	%W/W
Toplam Azot (N)	18
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	10
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	8
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	18
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,01

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

AGROAXOR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
ALTINKALE MAH. AKDENİZ BULV. MO:259/C DÖŞEMEALTI/ANTALYA
TEL: 0532 604 21 21

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No: 35064

Lisans No: 2055

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır

Parti No:

Net Ağırlık: 0,5- 1 -2- 2,5-3-4- 5- 10- 15- 20 -25-30-40-50 kg

AGROAXOR TARIM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
ALTINKALE MAH. AKDENİZ BULV. MO:259/C
DÖŞEMEALTI/ANTALYA
ANTALYA KURUMLAR: 0090983821

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
BAĞ	Filizlenme dönemi, salkım uzama dönemi, tane irime dönemi	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g/100 L suya	1- 3 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200 g /100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300 g / da	1-2 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR ,KANOLA, TÜTÜN vb	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama	250-300 g / da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200g /100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi,	250-300 g / da	2-4 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gelişim Sezonu boyunca 3 uygulama	250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi, Bayrak yaprak dönemi ve Tane dolum döneminde 3 uygulama	250 g / da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden Sonra	250 g / da	-

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

AGROAXOR TARIM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
ALTINKALE MAH. AKDENİZ BULV. NO:159/C
DÜŞÜNMEZİ, ANTALYA
ANTALYA KURUMLAR: 0090983821