

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Potazzo 5-0-25

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

Üre Azotu (N)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

(W/W)

%5

% 5

% 25



UYARILAR:

- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- * Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

TAVSİYELER:

- * Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
- * Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / +40°C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ	
		YAPRAKTAN (g/100 L su)	TOPRAKTAN (kg/da)
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb.	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb.	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb.	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Soğan, Sarımsak vb.	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb.	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.),Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	250-300	2 – 3
Yeşil alanlar	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	250-300	2 – 3



Tescil no: 32419
Lisans no: 2055
Üretim Tarihi: Kapakta yazmaktadır.
Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no: Kapakta yazmaktadır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri ;

Yoğunluk (1,3 g/mL)

Net ağırlık : 0,325-0,65-1,30-2,60-3,90-5,20-6,5-13-19,5-26-32,5-39-45,5-49,4 kg

Net hacim : 0,25 - 0,5 - 1 -2-3-4- 5 - 10 - 15 - 20 – 25-30-35-38 L

ÜRETİCİ: AGROAXOR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YÜKSEKALAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÇİL İŞHANI 41 12
MURATPAŞA ANTALYA
TEL& FAX: 02423111205

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 7223 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ

