

EC FERTİLİZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

FULN

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Üre Azotu (N-NH₂)
Biüresi Düşüktür

w/w
% 25
% 6
% 8
% 11

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI			
Bitki Adı	Uygulama Dönemi	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama (100 L Suda)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05 kg) / da	150-200 ml (183-244 g)
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05 kg) / da	150-200 ml (183-244 g)
Meyve Ağaçları	Vegetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05 kg) / da	150-200 ml (183-244 g)
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	200-250 ml (244-305 g)
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	200-250 ml (244-305 g)
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	200-250 ml (244-305 g)
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	100 ml (122 g) / Ocak	150-200 ml (183-244 g)
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	150-200 ml (183-244 g)
Şekerpancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2-2,5 L (2,44-3,05 kg) / da	200-250 ml (244-305 g)
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	150-200 ml (183-244 g)
Pamuk	Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi	2-3 L (2,44-3,66 kg) / da	200-250 ml (244-305 g)

Vegetatif gelişmenin yoğun olduğu dönemlerde 15 – 20 günde bir kez uygulanır.
Sebzeler ve meyveler için sulama sistemleri ile veya topraktan 2 – 4 L (2,44 – 4,88 kg) / da
Kesme çiçek içinse 1 – 3 L (1,22 – 3,66 kg) / da dozunda uygulanabilir.

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**
- * **Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.**

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARISABİLİRLİĞİ: Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Diğer taban gübrelere, ilaçlar ve sıvı gübrelere ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama ve taşıma esnasında koliler ters çevrilmemelidir. **Depolama Sıcaklığı – 5 ile + 35 °C arasında olmalıdır.**

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÜRETİCİ FİRMA: AGROQUATRO ORG. TAR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13 Bornova / İZMİR

Tel: 0 232 273 60 60 / www.agroquatro.com - info@agroquatro.com



Tescil No: 33743

Lisans No: 1489

Net Ağırlık:

Hacim:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır

Parti No:

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.

AGROQUATRO ORG. TAR.

SAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13
Bornova / İZMİR

Hasan Tahsin VD. 008 082 0620

Şirket Vekili
Burak Kişin