

EC FERTİLİZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
QUATRO ULTRA K 5-0-40

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

w/w
% 5
% 5
% 40



ÜRETİCİ FİRMA: AGROQUATRO ORG. TAR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 273 60 60 / www.agroquatro.com - info@agroquatro.com

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK: Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelerle ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
Gübreleme tozlarını teneffüs etmeyiniz.
Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.
Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI: Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, + 5 ile + 35 °C sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Tescil No: 21860
Lisans No: 1489
Net Ağırlık:

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır
Parti No:

KULLANMA TALİMATI

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu ile Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu 100 L Suda
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	150-200 g
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	150-200 g
Meyve Ağaçları	Meyve tutumundan sonra 3-4 uygulamaya bölünerek	100-150 g / Ağaç	150-200 g
Bağlar	Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve olgunlaşma döneminde arttırılarak kullanılmalıdır	3-5 kg / da	150-200 g
Zeytin	Son 2-3 sulamaya bölünerek	100-150 g / Ağaç	200-250 g
Narenciye	Meyve büyüme ve olgunlaşma döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek	150-200 g / Ağaç	200-250 g
Fındık	Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama	150 g / Ocak	150-200 g
Çilek	Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg / da	150-200 g
Şekerpancarı, Patates, Havuç	Çiçeklenmeden hemen sonra (hasattan 25-30 gün önce) 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg / da	200-250 g
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Çiçeklenmeden hemen sonra 10-15 gün arayla 2-3 uygulama	1,5-2 kg / da	150-200 g
Pamuk	Kozalara ben düşme başlangıcında 7-10 gün arayla 2-3 uygulama	1,5-2 kg / da	200-250 g

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.

AGROQUATRO ORG. TAR.

ŞAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13
Bornova / İZMİR
Hasan Tahsin YD: 008 082 0620

**Şirket Vekili
Burak Kişin**