

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GBT NPK 14-6-24 +(7CaO)

Garanti Edilen İçerik:

	% W/W
Toplam Azot (N)	14
Amonyum Azotu (N)	2,3
Nitrat Azotu (N)	9,4
Üre Azotu (N)	2,3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	24
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	7

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

BALAT PEYZAJ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA MİMARLIK
MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ALTINOVA MAH. YENİ YALOVA YOLU 424/5 BUTTİM İŞ MRK. E5 NO:1565/1 OSMANGAZİ /BURSA
TEL: 0224 211 15 94 FAX: 0224 211 15 95

UYARILAR

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 5135

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Parti No:

Net ağırlık : 0,25-0,5 - 1 - 2 -2,5-3-4- 5 - 10- 15-20 -25 – 30-35-40-50kg



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-250 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-250 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-250 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-250 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
KAVUN, KAPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-150 gr/da	0.5 -1 kg/ da
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	0.5 -1 kg/ da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	0.5 -1 kg/ da
ÇELTİK .	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200gr/da	0.5 -1 kg/ da
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/da	0.5 -1 kg/ da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	0.5 -1 kg/ da
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-250 gr/ 100 lt su	0.5 -1 kg/ da
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/da	0.5 -1 kg/ da
Yeşil Alan bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/ da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

•KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.

•KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph). KLOR. ORGANİK FOSFOR. ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.

•KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.

•KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).

■ UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.

•TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.

• ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR. SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE G.AZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

