

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
SANTOS ZİNC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : **W/W**
Suda Çözünür Çinko (Zn) **: % 9**

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ ve ZAMANI:

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	100-200 ml/da 6-8 yapraklı erken dönemde	0.2 – 0.5 lt/da İlk damalama sulama döneminde
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	100-200 ml/da Kardeşlenme döneminde	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yapraktan uygulanan herbisitlerle birlikte uygulanması tavsiye edilmez. Bunun dışında kalan diğer zirai mücadele ilaçları ve bitki besleme ürünleri ile birlikte uygulanabilir. Ancak karışımdan önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.

*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



İbrahim Tolga ULUŞAN

GBC AGRO TARIM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. 20. CAD.
NO:1/2 SİNCAN / ANKARA
V.NO : 3891576189

LİSANS NO :
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.
NET AĞIRLIK :

ÜRETİCİ FİRMA

GBC AGRO TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. 20. CAD. NO:1/2 SİNCAN / ANKARA
Tel: 0312 504 5053 Fax: 0312 514 0641

TAAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.