

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

AGRİNEXUS 15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik:

	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N)	15
Amonyum Azotu (N)	8
Nitrat Azotu (N)	4
Üre Azotu (N)	3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	15
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)	0,05
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	0,03
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	0,04

EDTA, Ş elatının Stabil Olduğ u pH Aralığ ı: (Cu, Fe ve Mn) için 3-8, (Zn) için 2-9

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

ORS TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONAKLI MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. 233 2 ALANYA ANTALYA
TEL: 0539 964 79 83

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 5621

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık :0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5-10- 15- 20 -25- 30-40 -50 kg

ORS TARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konaklı Mah. Mustafa Kemal Bul.
No: 233 İç Kapı No: 2 Alanya / ANTALYA
Tel: 0 539 964 79 83 Tlx: 28202
Mersis No: 0647874567800001
ANTALYA T.C. 647 074 5678

Coşkun AKKAYA
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	Tane Şişirme Döneminde 2 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan Sonra 15 gün ara ile 5 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim Dönemi boyunca 10 gün ara ile 4 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	Çiçeklenme Sonrası 1 Uygulama	70-100 g/100 L su	-
YERFISTIĞI	Yumru Oluşumu Sonrası	100-150 g/100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Bitkiler 50-70 cm Boya Ulaştığında 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	-
ÇELTİK .	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	-
ÇAY	Biçimden Sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru Oluşum Dönemi 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	1-2 kg / 1000 m ²
MEYVE FİDANLARI	Gelişim Dönemi boyunca 10 gün ara ile 4 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	200-250 g/100 L su	-
Yeşil Alan bitkileri	Biçimden Sonra	200-300 g/100 L su	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ORS TARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Konaklı Mah. Mustafa Kemal Bul.
No: 233 İç Kapı No: 2 Alanya / ANTALYA
Tel: 0 539 96 179 83 Tlx. Sic. No: 28202
Mersis No: 06 47874567800001
ALANYA T.C. 647 074 5678
Can AKKAYA
Firma Temsilcisi