

EC FERTILIZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

Golden Feed

20-10-20+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	%(w/w)
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (NH ₄ N)	7,5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	12,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,008
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,03

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!
NEVER EXCEED THE APPROPRIATE DOSE RATES!
USE ONLY WHERE NECESSARY !



NET :

EC FERTILIZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

Golden Feed

20-10-20+ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

0-40-40 / 10-50-5+ME / 15-30-15+ME				3-5-40+ME / 15-5-30+ME / 16-8-24+ME				18-18-18+ME / 20-10-20+ME/ 20-20-20+ME			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU		ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU		ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN			YAPRAKTAN	TOPRAKTAN			YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	FİDANCIYE	Fidantasyon öncesi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ELMA, ARMUT VB.	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ELMA, ARMUT VB.	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ZEYTUN, KAYI, KAHVE, KAHVE, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN, KAHVE, KAHVE, VİŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN, KAHVE, KAHVE, VİŞNE, ERİK ve NAR	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
MAR	Faaliyetten itibaren	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	BAG	Toprak uygulama dönemi 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	BAG	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ANTEP-PEYİNE FİREK	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ANTEP-PEYİNE FİREK	Tane dolum dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ANTEP-PEYİNE FİREK	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
ZEYİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYİN	Tane dolum dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYİN	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MUZ	Fide dikimden itibaren 15 gün ara ile 3 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
KIVI, KIRCI	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	KIVI, KIRCI	Meyve büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	KIVI, KIRCI	Genel uygulama dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	DOMATES, BİBER	Gelgen dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	HIYAR, PATLICAN	Gelgen dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KAVUN, KAPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KAVUN, KAPUZ	Gelgen dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelgen dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelgen dönemi boyunca	250-300 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelgen dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
MERCEK, NCHUT	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	-	MERCEK, NCHUT	Tane dolum dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	MERCEK, NCHUT	Genel uygulama dönemi	200-250 gr/100 L suya	-
YERBİTİ	Çiçeklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YERBİTİ	İç dolum dönemi	250-300 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YERBİTİ	Genel uygulama dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
PAMUK, AYÇİÇEK, MİSİR, KANOLA, TİTİLİK vb.	Bisikler 20-30 cm. İken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	PAMUK, AYÇİÇEK, MİSİR, KANOLA, TİTİLİK vb.	Bisikler 40-50 cm. İken 15 gün ara ile 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	PAMUK, AYÇİÇEK, MİSİR, KANOLA, TİTİLİK vb.	Bisikler 10-20 cm. İken	200-250 gr/100 L suya	-
ÇELTİK	Karadelenme dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	ÇELTİK	Tane dolum dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	ÇELTİK	Sapa kalınlaşma dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
ÇAY	Gelgen dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-2 kg/dk	ÇAY	Gelgen dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	ÇAY	Gelgen dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
ŞEKER PANCAR	Yumuraklama dönemi 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-3 kg/dk	ŞEKER PANCAR	Yumuraklama dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ŞEKER PANCAR	Yumuraklama dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
MEYVE FIDANLARI	Gelgen dönemi boyunca 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	MEYVE FIDANLARI	Gelgen dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MEYVE FIDANLARI	Gelgen dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
HUBUBAT	Karadelenme dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	HUBUBAT	Tane dolum dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	HUBUBAT	Sapa kalınlaşma dönemi	200-250 gr/100 L suya	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelgen dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelgen dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelgen dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	-

APPLICATION DOSES AND USAGE PERIODS

0-40-40 / 10-50-5+ME / 15-30-15+ME				3-5-40+ME / 15-5-30+ME / 16-8-24+ME				18-18-18+ME / 20-10-20+ME/ 20-20-20+ME			
CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSSAGE		CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSSAGE		CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSSAGE	
		FOLIAR	SOIL			FOLIAR	SOIL			FOLIAR	SOIL
CITRUS	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	CITRUS	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	CITRUS	Shooting Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
APPLE, PEAR ETC.	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	APPLE, PEAR ETC.	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	APPLE, PEAR ETC.	Budbreak Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
PEACH, APRICOT, CHERRY, SOFT HAWTHORN, PLUM and POMEGRANATE	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOFT HAWTHORN, PLUM and POMEGRANATE	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOFT HAWTHORN, POMEGRANATE	Budbreak Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
VINEYARD	Beginning of shooting	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PESTICIDE HAZELNUT	Grain Growth Period	250-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PESTICIDE HAZELNUT	Budbreak Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
PESTICIDE HAZELNUT	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	OLIVE	Grain Ripening Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	OLIVE	Budbreak Period	250-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk
OLIVE	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	BANANA	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	BANANA	3 applications with an interval of 15 days from seedling planting	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
BANANA	2 applications with 15 day interval before bunch emergence	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	KWIL FIG	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	KWIL FIG	Budbreak Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
KWIL FIG	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	TOMATO PEPPER	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	TOMATO PEPPER	3 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
TOMATO PEPPER	Flowering period 3 applications with 15 day intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUCUMBER, EGGPLANT	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUCUMBER, EGGPLANT	3 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
CUCUMBER, EGGPLANT	Flowering period 3 applications with 15 day intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
MELON, WATERMELON	Flowering period 3 applications with 15 day intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	LENTIL, CHICKPEA	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	-	LENTIL, CHICKPEA	2 applications after the germination period	200-250 gr/100 L water	-
CUT FLOWER	3 applications during growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PEANUT	Interval Filling Period	200-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PEANUT	2 applications after the germination period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
LENTIL, CHICKPEA	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	COTTON, SUGAR COWPEA, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	2 applications with 15 days interval when the plants are 40-50 cm	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	COTTON, SUGAR COWPEA, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	When plants 10-20 cm	200-250 gr/100 L water	-
PEANUT	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	RICE	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	RICE	Stem elongation period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
COTTON, SUGAR COWPEA, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	2 applications with 15 days interval when the plants are 40-50 cm	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	TEA PLANT	Straw Growth Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	TEA PLANT	During growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
RICE	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	SUGAR BEET	Straw Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	SUGAR BEET	2 applications later growth period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk
TEA PLANT	2 applications during growth period	200-250 gr/100 L water	1-2 kg/dk	FRUIT SAVING	Straw Growth Period	200-250 gr/100 L water	-	FRUIT SAVING	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
SUGAR BEET	2 applications later formation	250-300 gr/100 L water	2-3 kg/dk	CEREALS	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	-	CEREALS	Stem elongation period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
FRUIT SAVING	2 applications during growth period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	GREEN AREAS	Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	GREEN AREAS	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	-
CEREALS	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk								
GREEN AREAS	During growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk								

UYARILAR : * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız. * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz. * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA: * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında depolanmalıdır. Fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI : İmalatçı firma, tavsiyelerine uyulurak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece,ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

WARNING: • Keep away from children, animals and food. • Do not exceed the recommended dose and use only where necessary. • Avoid contact with eyes, face and skin. • Was with plenty of water in contact. • Wash hands with plenty of water after use. • Do not exceed recommended dosage. • Do not use empty packages for any other purposes. • Destroy empty packages after use. • It is recommended to make an analysis of the soil before application of the fertilizer.

STORAGE: When stored in the original packaging, in cool and dry area, in the temperature between 0-45 °C, the product keeps its physical and chemical characteristics for 3 years. For this reason, keep the product its original packages; in dry and cool area and between indicated temperatures. Keep it away from direct sunlight.

COMPANY STATEMENT: The manufacturer company guarantees the quality of the product when used according to recommended methods of application. The conformity of the product to its specification is only guaranteed by the company at the time of delivery of product. The product is out of warranty and the manufacturer is not responsible for all damage if it is stored out of cautions or used out of recommendation

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

COUNTRY OF ORIGIN: TÜRKİYE

Golden Feed