



EC FERTİLİZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

portion plant 20-20-20

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	%(w/w)
Toplam Azot (N)	20
Üre Azotu (NH ₂ -N)	16
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	4
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20

NET :

merkez
ANADOLU KİMYA

EC FERTİLİZER
NPK Gübresi Harmanlanmış
**portion
plant**

portion plant

portion plant

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

0-38-38 / 15-30-15+ME (ÜREL) / 15-30-15+ME (ÜRESİZ)				3-5-40+ME / 10-0-46 / 15-5-30+ME / 16-8-24+ME (ÜREL) / 16-8-24+ME (ÜRESİZ)				18-18-18+ME (ÜREL) / 18-18-18+ME (ÜRESİZ) / 20-10-20+TE / 20-10-20+ME / 20-20-20			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN	ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN	ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
MAHONCHE	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	MAHONCHE	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da	MAHONCHE	Harmanlama öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ELMA, ARMUT VB.	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da	ELMA, ARMUT VB.	Çiğdemme öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİLLİ KAYIYA KIRAZ, VİŞNE, DİREK VE NAR	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ZEYTİLLİ KAYIYA KIRAZ, VİŞNE, DİREK VE NAR	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da	ZEYTİLLİ KAYIYA KIRAZ, VİŞNE, DİREK VE NAR	Çiğdemme öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAG	Harmanlama öncesi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	BAG	Taahhüt öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	BAG	Çiğdemme öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ANTEP FİSTİĞİ FİNKİ	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ANTEP FİSTİĞİ FİNKİ	Taahhüt öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da	ANTEP FİSTİĞİ FİNKİ	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ZEYTİN	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ZEYTİN	Taahhüt öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ZEYTİN	Çiğdemme öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Çiğdemme öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da	MUZ	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	MUZ	Fruit abscission öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
KIVILINCI	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	KIVILINCI	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	KIVILINCI	Çiğdemme öncesi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES BİBER	Çiğdemme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	DOMATES BİBER	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	DOMATES BİBER	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIVAR PATLICAN	Çiğdemme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	HIVAR PATLICAN	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	HIVAR PATLICAN	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN KAPUZ	Çiğdemme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	KAVUN KAPUZ	Meşme büyüme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	KAVUN KAPUZ	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiğdemme öncesi 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiğdemme öncesi 3 uygulama	250-300 g/100 L suya	1-3 kg/da	KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiğdemme öncesi 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERİMEK NODUT	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	MERİMEK NODUT	Taahhüt öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	-	MERİMEK NODUT	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	-
YERBİSTİ	Çiğdemme öncesi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	YERBİSTİ	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	1-3 kg/da	YERBİSTİ	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEK, NAR, KANKAL, TOTOVA VB.	Bisler 20-30 cm. İken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 g/da	-	PAMUK, AYÇİÇEK, NAR, KANKAL, TOTOVA VB.	Bisler 40-50 cm. İken 15 gün ara ile 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	-	PAMUK, AYÇİÇEK, NAR, KANKAL, TOTOVA VB.	Bisler 10-20 cm. İken	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ÇELTİK	Karadelenme öncesi	200-250 g/da	-	ÇELTİK	Taahhüt öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	-	ÇELTİK	Sapa kalma öncesi	200-250 g/100 L suya	-
ÇAY	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	ÇAY	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	ÇAY	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCAR	Yumur olgunlaşma öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ŞEKER PANCAR	Yumur olgunlaşma öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da	ŞEKER PANCAR	Yumur olgunlaşma öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da	MEYVE FIDANLARI	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da	MEYVE FIDANLARI	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Karadelenme öncesi	200-250 g/da	-	HUBUBAT	Taahhüt öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	-	HUBUBAT	Sapa kalma öncesi	200-250 g/100 L suya	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Çiğdemme öncesi 3 uygulama	200-250 g/da	-	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Çiğdemme öncesi 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	-	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Çiğdemme öncesi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	-

APPLICATION DOSES AND USAGE PERIODS

0-38-38 / 15-30-15+ME (With Urea) / 15-30-15+ME (Without Urea)				3-5-40+ME / 10-0-46 / 15-5-30+ME / 16-8-24+ME (With Urea) / 16-8-24+ME (Without Urea)				18-18-18+ME (With Urea) / 18-18-18+ME (Without Urea) / 20-10-20+TE / 20-10-20+ME / 20-20-20			
CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSE	SOIL	CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSE	SOIL	CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSE	SOIL
CITRUS	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	CITRUS	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da	CITRUS	Shooting Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
APPLE, PEAR ETC.	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	APPLE, PEAR ETC.	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da	APPLE, PEAR ETC.	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
PEACH, APRICOT, CHERRY, SOUP CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOUP CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOUP CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
VINEYARD	Beginning of shooting	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	VINEYARD	Veraison period 2 applications	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	VINEYARD	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
PITACHO, HAZELNUT	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	PITACHO, HAZELNUT	Grain Ripening Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da	PITACHO, HAZELNUT	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
OLIVE	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	OLIVE	Grain Ripening Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	OLIVE	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
BANANA	2 applications with 7-8 days interval before shoot emergence	200 g/100 L water	1-3 kg/da	BANANA	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	BANANA	2 applications with an interval of 15 days from anthesis period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
KW-FRG	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	KW-FRG	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	KW-FRG	Budbreak Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
TOMATO, PEPPER	Flowering period 3 applications with 15 days interval	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	TOMATO, PEPPER	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	TOMATO, PEPPER	3 applications during the growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUCUMBER, EGGPLANT	Flowering period 3 applications with 15 days interval	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	CUCUMBER, EGGPLANT	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	CUCUMBER, EGGPLANT	3 applications during the growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
MELON, WATERMELON	Flowering period 3 applications with 15 days interval	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	MELON, WATERMELON	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	MELON, WATERMELON	3 applications during the growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUT FLOWER	3 applications during growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	CUT FLOWER	During Growth Period	250-300 g/100 L water	1-3 kg/da	CUT FLOWER	3 applications during the growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
LENTIL, CHICKPEA	Flowering period	200-250 g/da	-	LENTIL, CHICKPEA	Grain Growth Period	250-250 g/100 L water	-	LENTIL, CHICKPEA	2 applications after the germination period	200-250 g/100 L water	-
PEANUT	Flowering period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	PEANUT	Grain Growth Period	250-300 g/100 L water	-	PEANUT	2 applications after the germination period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
COTTON, SUGAR BEET, CORN, CANKAL, TOMACCO ETC.	2 applications with 7-8 days interval when the plant are 10-20 cm	200-250 g/da	-	COTTON, SUGAR BEET, CORN, CANKAL, TOMACCO ETC.	Grain Growth Period	250-300 g/100 L water	-	COTTON, SUGAR BEET, CORN, CANKAL, TOMACCO ETC.	When plants 10-20 cm	200-250 g/100 L water	-
RICE	Tillering period	200-300 g/da	-	RICE	Grain Growth Period	200-250 g/100 L water	-	RICE	Stem elongation period	200-250 g/100 L water	-
TEA PLANT	2 applications during growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	TEA PLANT	During Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	TEA PLANT	During growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
SUGAR BEET	2 applications tuber formation	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	SUGAR BEET	Tuber Growth Period	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da	SUGAR BEET	2 applications tuber growth period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
FRUIT SARDING	2 applications during growth period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da	FRUIT SARDING	During Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da	FRUIT SARDING	3 applications during the growth period	200-300 g/100 L water	1-3 kg/da
CEREALS	Tillering period	200-300 g/da	-	CEREALS	Grain Growth Period	200-250 g/100 L water	-	CEREALS	Stem elongation period	200-250 g/100 L water	-
GREEN AREAS	During growth period	200-250 g/da	-	GREEN AREAS	Growth Period	200-250 g/100 L water	-	GREEN AREAS	2 applications during the growth period	200-250 g/100 L water	-

UYARILAR : * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız. * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz. * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA : * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI : İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacakmış taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

Tescil No / Reg. No :
Lisans No / Lic. No : 199
Üretim Tarihi / Prod. Date :
Son Kullanma Tarihi / Exp. Date :
Parti No / Lot No :

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

COUNTRY OF ORIGIN: TÜRKİYE