

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

ZEP QUEEN 10-50-5+ME

Garanti Edilen İçerik:

	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N)	10
Amonyum Azotu (N)	10
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	50
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	50
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,03
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,03

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
A.O.S.B. 2.KISIM MAH. 24. CAD. NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
TEL: 0 242 258 01 40 FAX: 0 242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 199

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık :0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5-6-9- 10- 15- 18-20 -25- 30-40 -50 kg

**MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**
A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2
Döşemealtı / ANTALYA Tic. Sic. No: 35359
Antalya Kurumlar V.D. 617 835 5104
Mersis No: 08 35 0040 0001
CELİFAKHAYA
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	Tane Şişirme Döneminde 2 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan Sonra 15 gün ara ile 5 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim Dönemi boyunca 10 gün ara ile 4 Uygulama	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	Çiçeklenme Sonrası 1 Uygulama	70-100 g/100 L su	-
YERFISTIĞI	Yumru Oluşumu Sonrası	100-150 g/100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 50-70 cm Boya Ulaştığında 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	-
ÇELTİK .	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	-
ÇAY	Biçimden Sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru Oluşum Dönemi 2 Uygulama	100-150 g/100 L su	
MEYVE FİDANLARI	Gelişim Dönemi boyunca 10 gün ara ile 4 Uygulama	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT	Tane Dolum Döneminde 15 gün ara ile 2 Uygulama	200-250 g/100 L su	-
Yeşil Alan bitkileri	Biçimden Sonra	200-300 g/100 L su	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

**MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**
A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2
Döşemealtı / ANTALYA Tic. Sic. No: 25359
Antalya Kurumlar V.D. 610 855 6104
Mersis No: 045 1040 0001
ÇİFTAKHAYA
Flora Temsilcisi