

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
SOLUNEC 19-6-20 +ME

Garanti Edilen İçerik:	%W/W
Toplam Azot (N)	19
Amonyum Azotu (N)	6,2
Nitrat Azotu (N)	6
Üre Azotu (N)	6,8
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	0,005
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,02
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	0,02

EDTA, Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24.Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA

Tel: 0 242 258 01 41- 47 Faks: 0 242 258 01 48

UYARILAR

- *Dikkat Çocuklardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Önerilen dozajı aşmayınız
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:9809

Lisans No: 116

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sora 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2- 2,5- 4- 5- 6-10- 15 – 18- 20 -25- 30-40 -50 kg

NEKTAR TARIM
TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mh. 24. Cd. No:2
Döşemealtı/ANTALYA
Tel:0242 258 01 41-47 Faks:0242 258 01 48
Kurumlar V.D. 631 008 3403
Haydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g/100 L su	-
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, , KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g/100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g/100 L su	-
MEYVE FİDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g/100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g/100 L su	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

•KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.

•KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph). KLOR. ORGANİK FOSFOR. ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.

•KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.

•KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).

■ UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.

•TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.

•ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 g SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 g ÜRÜNÜ KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 g EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE G.AZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NEKTAR TARIM
TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mh. 24. Cd. No:2
Dışçimenli/ANTALYA
Tel:0242 259 01 41 - Faks:0242 988 01 44
Kurumlar Y.D 631 008 3483
Haydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi