

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ - EDDHA
FERROPLANE

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

(W/W)

%6,0

%6,0

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

3-9

Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



İTHALATÇI FİRMA

ULUÇINAR TARIM İLAÇLARI TOHUM GÜBRE PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
A.O.S.B. 2. KISIM MAH. 24. CAD. NO:2 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel:0242 258 01 40

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN g/dekar (100 L su ile)	DAMLA SULAMADAN g/dekar (1ton su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
Karpuz, Kavun, Kabak			
Çilek			
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
Muz	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
Narenciye	İlkbahar sürgünleri 2-3 oranında uzadığında	100-150	200-250
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Elma, Armut, Ayva			
Zeytin			
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Patates, Şeker Pancarı	Yumru irileşme döneminde	75-100	200-250
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
Pamuk	Taraklanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
Fasulye, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Yaprağı yenen sebzeler (marul, Kıvırcık, Lahana vb.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
Soğan, Sarımsak, Havuç	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Yeşil alanlar Kesme Çiçekçilik	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Şti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım / A. O. S. B.
Kurumlar Y.D. 888 017 2261

Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız. *Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. *Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA SARTLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARISABİLİRLİK

Yüksek Alkali İlaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO:32975

LİSANS NO: 746

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

Net Ağırlık: 0,25-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30-35-40-50 kg

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Sti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kurum 21. Ad.
Kurumlar Y.D. 888 067 2261
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi