

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

PARDUS 20-10-20 +ME

Garanti Edilen İçerik:

% W/W

Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N)	3
Üre Azotu (N)	17
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,06
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 Fax: 0242 258 01 48

UYARILAR

Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:32776

Lisans No: 746

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sora 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2- 2,5- 4- 5- 6-9-10- 15 – 18- 20 -25- 30-40 -50 kg

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Şti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24 Cad.
Kurumlar Y.D. 888 017 2261
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g/100 L su	-
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g/100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g/100 L su	-
MEYVE FİDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 g/100 L su	-
Yeşil Alan bitkileri	Her biçimden sonra	200-300 g/100 L su	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Sti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24. Ad.
Kurumlar YOL 888 067 2201
Haydar ALI KARAKOC
Firma Temsilcisi